

## ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ(四種混合DPT-IPV) 1期

**ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオワクチン** ☆不活化ワクチンです。

**対象年齢** 生後2か月～7歳6か月の前日まで

**接種回数** 初回3回+追加1回の計4回

**接種間隔** 20日以上、標準的に20日～56日の間隔をあけて初回3回接種後、6か月以上(標準として1年～1年半)の間隔をあけて1回(万一間隔があいてしまった場合は、接種医にご相談ください。)

※2期として11歳の時にDT(ジフテリア・破傷風)二種混合ワクチンで1回接種を行います。

### ジフテリアとは？

ジフテリア菌の飛沫感染(のど、鼻)で起こります。無症状の保菌者から感染することもあります。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などです。窒息死や、菌からの毒素で心筋障害や神経麻痺を起こすこともあります。

### 百日せきとは？

百日せき菌の飛沫感染で起こります。普通の風邪のような症状からせきがひどくなり、笛を吹くような音が出ます。乳幼児はせきで呼吸ができず、唇が青くなったり、けいれんが起ることもあります。肺炎や脳症などの合併症や、乳児では死亡することもあります。

### 副反応

接種部位の紅斑、しこり、はれ、発熱が主な副反応で、接種後3日までにみられます。重い副反応はなくても、機嫌が悪くなったり、はれが目立つときなどは医師にご相談ください。

### 破傷風とは？

土の中にいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体内で増えるとその毒素によって口が開かなくなったり、けいれんを起こしたり、死亡することもあります。土中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。

### ポリオとは？

手や足の麻痺があらわれる感染症です。口の中から入ったポリオウイルスが腸の中で増え、便の中に排出されて他の人に感染していきます。感染者の大部分は無症状ですが、感染者の1,000～2,000人に1人に麻痺があらわれます。一部の人には、その麻痺は一生残ります。